

疫

疹

一

得

疫疹一得卷下

桐溪師愚氏余 霖輯著

瘥後二十症

四肢浮腫

瘥後四肢浮腫因大病脾土受傷脾虛不能制水飲食驟進氣血滋榮流於四肢夜則如常日則浮腫脾健自愈誤用溫補反添蛇足

大便燥結

瘥後飲食漸增而大便或十日半月不下亦不覺其苦此因熱病

腸胃乾燥血不能潤氣不能送誤用通利死不終朝矣

皮膚痛癢

毒火最重之症氣血被其煎熬瘡後飲食漸進氣血滋生串皮膚而澀百骸或痛或癢宛如蟲行最是佳境不過兩三日氣血流通而自愈矣

半身不遂

疫症失治於前熱流下部滯於經絡以致腰膝疼痛甚者起不能立卧不能動誤作痿治必成廢人 經駢

食少不化

瘥後不欲飲食縱食亦不化此乃脾虛胃弱宜健脾養胃

驚悸

瘥後血虛肝失其養胆無所恃怯而驚悸

怔忡

病後水衰火旺心腎不交故燥動不寧

失音

瘥後有聲不能言此水虧不能上接於陽也

鄭聲

鄭聲者聲戰無力語不接續乃氣虛也

喜唾

瘥後喜唾不能自止者胃中有寒也宜溫之熱病愈後吐津不止雖屬胃虛猶有餘熱不宜溫之只用梅棗丸啗之立愈

多言

言者心之聲也病中謔妄乃胃熱乘心瘥後多言者猶有餘熱也譬如滅火其火已息尚有餘烟

遺精

精之主宰在心精之藏制在腎瘥後心腎氣虛不能管攝故遺

恐懼

瘧後觸事易驚夢寐不寧乃胆有餘熱熱極生痰痰與氣搏故恐懼

昏睡

終日昏昏不醒或錯語呻吟此因邪熱未盡伏於心胞絡所致

自汗盜汗

心之所藏在内為血在外為汗汗者心之液也而腎主五液故汗症未有不從心腎而得者陽虛不能衛外而為固則外傷而自汗陰虛不能內營而退藏則內傷而盜汗

心神不安

瘥後心血虧損心失其養以致心神不安

虛煩不寐

瘥後氣血兩虛神不守舍故煩而不寐

勞復

大病瘥後早犯女色而病者為女勞復女犯者為男勞復其症頭重不能舉目中生花腰背疼痛四肢無力憎寒發熱陰火上衝頭面烘熱心胸煩悶活人書以鞣鼠屎湯主之有熱者竹皮湯燒鼠散主之千金以赤衣散虛弱者以人參三白湯調赤衣散最妙脈沉細逆冷小腹急痛者以當歸四逆散加附子黃芩調赤衣散救

之更以吳茱一升酒拌炒熨小腹最妙凡男卵縮入腹女乳縮脹
雖經者死下可救予治勞復用麥冬湯每每取效

食復

瘥後餘熱未盡腸胃虛弱不能食而強食之熱有所藏因其穀氣
留搏兩陽相合而病者名曰食復

陰陽易

男子病後元氣未復而婦人與之交接得病者名曰陽易女人病
後元氣未復而男子與之交接得病者名曰陰易其狀男子則陰
腫入腹絞痛難忍婦人則乳抽裏急腰膝痛引腹內熱攻胃膈頭

重難抬仰臥不安動搖不得最危之症

瘟毒發瘡

瘟毒發症毒之散者也瘟毒發瘡毒之聚者也初起之時惡寒發熱紅腫硬痛此毒之發揚者但寒下熱平扁不起此毒之內伏者或發於要地發於無名發於頭面發於四肢種種形狀總是瘡症何以知其是疫然診其脈驗其症而即知也瘡症之脈洪大而數疫則沉細而數瘡症先熱後寒疫則先寒後熱瘡症頭或不痛疫則頭痛如臂沉不能舉是其驗也稽其症有目紅面赤而青慘者有忽汗忽躁者有昏瞶如迷者有身熱肢冷者有腹痛不已者有

大吐乾嘔者有大泄如注者有謔語不止者有妄聞妄見者有大渴思水者有煩燥如狂者有忽喊忽叫者有苦驚若惕者神情多端大都類是誤以瘡症治之斷不能救

娠婦疫疹

娠婦有病安胎為先所謂有病以末治之也獨至於疫則不然何也母之於胎一氣相連母病即胎病母安則胎安夫胎賴血以養母病熱疫之症熱即毒火也毒火蘊於血中是母之血亦為毒血矣毒血尚可養胎乎不急有以治其血中之毒而拘拘以安胎為事母先危矣胎能安乎人亦知胎熱則動胎涼則安母病毒火

最重之症胎自熱矣極力清解涼血使母病一解而胎不心安自無不安矣至於產後以及病中適逢經來當以類推若以產後經期藥禁寒涼則誤人性命只數日間耳急則治其標者此之謂也

疫疹之形

鬆浮

鬆而且浮灑於皮面或紅或紫或赤或黑此毒之外現者即照本方治之雖有惡症百無一失

緊束有根

疹出緊束有根如從肉裏鑽出其色青紫宛如浮萍之背多見於

胸背此胃熱將爛之色急宜大清胃熱兼涼其血務使鬆活色退方可挽回稍存疑懼即不能救

疫疹之色

紅活

血之體本紅血得其暢則紅而活榮而潤敷布洋溢是疹之佳境也

淡紅

淡紅有美有疵色淡而潤此色之上者也若淡而不榮或嬌而艷乾而滯血之最熱者

深紅

深紅者較淡紅而稍重亦血熱之象一經涼血即轉淡紅

艷紅

色艷如胭脂此血熱極之象較深紅而愈惡必大用涼血始轉深紅再涼之而淡紅矣

紫赤

紫赤類雞冠花而更艷較艷紅而大更盛不急涼之必至變黑

紅白砂

細碎宛如粟米紅者謂之紅砂白者謂之白砂疹後多有此症乃

餘毒盡透最美之境愈後脫皮若初病未認是疫後十日半月而出者煩燥作渴大熱不退毒發於頸者死不可救

疫癘不治之症

疫症初起六脈細數沉伏面頰青慘昏憤如迷四肢逆冷頭汗如雨其痛如劈腹內攪腸欲吐不吐欲泄不泄男則仰臥女則覆臥搖頭鼓頤百般不足此為間疫斃不終朝矣如欲挽回作萬一非大劑清瘟敗毒飲不可醫家即或敢用病家決不敢服與其束手待死莫知合藥而止雖然難矣哉

疫癘諸方

敗毒散

治時行疫癘頭痛憎寒壯熱煩強時時鼻塞聲重

痰喘眼赤口瘡壯毒流注脚腫腿腫諸瘡癰疽喉痺吐泄

羌活一錢五分

獨活一錢

柴胡一錢

前胡一錢五分

川芎一錢

枳殼一錢

桔梗一錢

茯苓一錢五分

甘草一分

薄荷一錢

疫症初起服此先去其爪牙使邪不盤踞經絡有症即透較升

葛荆防發表多多矣如口乾舌燥加黃芩喉痛加山豆根倍加

桔梗甘草古方引用生薑薑乃暖胃之品疫乃胃熱之症似不

宜用以急易之

此足太陽少陽陽明藥也羌活入太陽而理游風獨活入太陰而

理伏邪能除痛柴胡散熱升清協川芎和血平肝以治頭痛
目昏前胡枳殼降氣行痰協桔梗茯苓以泄肺熱而除濕消腫
甘草和裡而發表更以薄荷為君取其辛涼氣味俱薄疏導經
絡表散能除高巔邪熱古人名曰敗毒良有以也

涼膈散方

治心火上盛中焦燥實煩燥口渴目赤頭眩口瘡唇

裂吐血衄血諸風癰瘰胃熱發癰發狂驚悸瘧風

連翹

生梔子一錢黃芩一錢薄荷一錢桔梗一錢

竹葉

生石膏三錢甘州一錢

此上中二焦瀉火藥也熱滯于內治以鹹寒佐以苦甘故以連

翹黃芩竹葉薄荷升散于上。古方用大黃芒硝推蕩其中。使上升下行而膈自清矣。予憶疫疹乃無形之毒。投以硝黃之猛烈。必至內潰。予以石膏易去硝黃。使熱降清升而疹自透。亦上升下行之意也。

清痘敗毒飲一治一切火熱表裡俱盛。狂煩煩心口乾。喘痛大乾。嘔錯語。不眠。吐血。衄血。熱盛發斑。不論始終。以此為主。後酌加減。

生石膏

大劑六兩至四兩。中劑三兩至四兩。小劑一兩至二兩。

小生地

大劑六錢至二兩。中劑三錢至五錢。小劑一錢至三錢。

烏犀角

大劑六錢至二兩。中劑三錢至四錢。小劑一錢至二錢。

真川連

大劑一錢至四錢。中劑二錢至三錢。小劑一錢至二錢。

赤

芍

大劑三錢
小劑一錢五分

連

翹

大劑三錢
小劑一錢五分

桔

梗

大劑三錢
小劑一錢五分

生
梔子

大劑三錢
小劑一錢五分

黃

芩

大劑三錢
小劑一錢五分

知
母

大劑三錢
小劑一錢五分

丹

皮

大劑四錢
小劑一錢五分

甘
州

大劑三錢
小劑一錢五分

元

參

大劑三錢
小劑一錢五分

竹
葉

大劑三錢
小劑一錢五分

疫症初起惡寒發熱頭痛如劈煩燥譫妄身與肢冷舌刺唇焦

上喘下泄六脉沉細而數即用大劑近而數者用中劑浮大而

數者用小劑如癰一出即用大青葉量加升麻四五分引毒外

透比內化外解濁毒清升之法治一得一治十得十以視升提

炭表而應刺者何不將取高亮之一得也

此十二經泄火之藥也癰疹雖出於胃亦諸經之火有以助之
重用石膏直入胃經使其敷布於十二經還其淫熱佐以黃連
犀角黃芩泄心肺火於上焦升皮槌子赤芍瀉肝經之火生翹
元參解散浮游之火生地知母抑陽扶陰泄其亢甚之火而救
欲絕之水桔梗竹葉載藥上行使以甘草和胃也此皆大寒解
毒之劑故重用石膏先平甚者諸經之火自無不平矣

疫疹之症

頭痛傾側本方加石膏

元參

甘菊花

骨節煩痛腰如被杖本方加石膏

元參

黃柏

通體炎炎本方加石膏

生地

川連

黃芩

丹皮

靜躁不常本方加石膏

川連

犀角

丹皮

黃芩

火擾不寐本方加石膏

犀角

琥珀

川連

週身如冰本方加石膏

川連

犀角

黃柏

丹皮

梔子

四肢逆冷本方加石膏

治一切火熱、表裏傷寒、或心煩、或口乾咽痛、或大惡乾嘔、或錫湯小水、或吐血、或

筋抽脉惕本方加石膏
丹皮 胆艸

大渴不已本方加石膏
范粉

胃熱不食本方加石膏
只虎

胃脘鬱遏本方加川連
枳壳 桔梗 枳實

脉間無聲本方加石膏
川連 羊角 黃芩

羚羊角 桑皮

筋肉痠動本方加生地
石膏 黃柏 元參

冷氣上升本方加石膏
生地 丹皮 川連

犀角 胆艸

口穢噴人本方加石膏

川連

犀角

滿口如霜本方加石膏

川連

連翹

犀角

黃柏

生地

咽喉腫痛本方加石膏

桔梗

元參

牛子

射干

山豆根

嘴唇掀腫本方加石膏

川連

連翹

天花粉

臉上燎泡本方加石膏

生地

銀花

板藍根

紫花地丁

馬勃

歸尾

丹皮

元參

大頭天行本方加石膏

歸尾

板藍根

馬勃

紫花地丁

銀花

元參

姜黃

生大黃

量加

疔腮本方加

石膏

歸尾

銀花

元參

紫花地丁

丹皮

馬勃

連翹

板藍根

頭頸腫痛本方加石膏

桔梗

牛子

夏枯草

紫花地丁

元參

連翹

銀花

山豆根

耳後痛硬本方加石膏

連翹

生地

天花粉

紫花地丁

丹皮

銀花

元參

板藍根

哈舌弄舌本方加石膏

川連

犀角

黃柏

元參

紅絲繞目本方加菊花

紅花

蟬衣

歸尾

谷精汁

頭汗如湧本方加石膏

元參

咬升本方加

石膏

生地

丹皮

胆草

梔子

鼻血泉湧本方加石膏

生地

黃連

羚羊角

桑皮生用

元參

棕灰

黃芩

舌上珍珠本方加石膏

川連

犀角

連翹

淨銀花

元參

花粉

舌如鉄甲本方加石膏

犀角

川連

知母

天花粉

連翹

元參

黃柏

舌丁本方加

石膏

川連

犀角

連翹

銀花

舌長

以片腦為末塗舌上應手而縮甚者必需五錢而愈

舌衄本方加

石膏

丹皮

生地

川連

犀角

梔子

敗棕灰

齒衄本方加

石膏

黃柏

生地

丹皮

梔子

犀角

黃連

元參

黃芩

諸語本方加

石膏

川連

犀角

丹皮

梔子

黃柏

龍胆草

完逆本方加

石膏

柿蒂

銀杏

竹茹

羚羊角

枇杷葉

不止用四葉或一升調服本方即止
四葉飲之香與柳葉為尤

嘔吐本方加

石膏

川連

消石

甘州

伏龍脾

似痢非痢本方加

石膏

川連

消石

猪苓

澤瀉

瓜通

熱注大腸加同上

大便不通蜜煎
導法

大便下血本方加

槐花

棕灰

側柏葉

小便短縮如油本方加

滑石

澤瀉

猪苓

木通

通神

扁蓄

小便溺血本方加生地

桃仁

滑石

茅根

川牛膝

琥珀

棕灰

餘狂本方加

石膏

犀角

川黃連

梔子

丹皮

黃柏

痰中帶血本方加石膏

黃芩

棕灰

生桑皮

羚羊角

生地

枯姜霜

遺尿本方加

石膏

川黃連

犀角

滑石

喘嗽本方加

桑皮

黃芩

石膏

羚羊角

發黃本方加

石膏

滑石

梔子

茵陳

猪苓

澤瀉

木通

循衣摸牀本方加石膏

川連

犀角

丹皮

梔子

胆艸

狐惑本方加

石膏

犀角

苦參

烏梅

槐子

戰汗

戰後汗出脉靜身涼不用服藥尚有餘熱即服本方小劑一乘而安

瘰癧瘡本方加石膏

生地

川連

紫花地丁

金銀花

加^上升麻

加^下川牛膝

加^胃只虎

蒲公英

加^背威靈仙

出^頭皂刺

以上五十二症按症加減以下瘡後二十症另載各症諸方

作本症下

四肢浮腫

加味六珍湯

人參^{二錢}

于朮^{一錢}

云苓^{二錢}

木香^{三錢}

砂仁^{五分}

甘草^{一分}

薏仁^{五錢}

澤瀉^{一錢}

生薑^{一片}

黑膠漆^{二枚}

大便燥結

當歸潤燥湯

氣虛者加人參黃芪

大熟地

五錢

當歸

三錢

蘇仁

二錢

郁李仁

三錢

肉蓯蓉

一錢

杏仁

一錢

白蜜

一匙

皮膚痛癢

八珍湯

人參

一錢

白朮

一錢

茯苓

一錢

甘草

一錢

生地

三錢

當歸

二錢

川芎

一錢

白芍

一錢

生薑

一錢

黑棗

二錢

半身不遂

小劑敗毒散加

木瓜

牛膝

續斷

草薢

黃柏

知母

威靈仙

食少不化

加味異攻散

人參一錢

白朮一錢

茯苓一錢

陳皮一錢

山楂二錢

谷芽三錢

甘竹五錢

砂仁八分

生薑二片

黑棗三枚

驚悸

茯神鎮驚湯

人參一錢

黃芪一錢半

白芍一錢

麥冬二錢

當歸二錢

茯神三錢

遠志一錢半

龍齒二錢

琥珀一錢

炙甘草八分

龍眼三枚

灯心三十寸

怔忡

琥珀養心湯

人參一錢

當歸二錢

茯神三錢

杏仁一錢半

遠志一錢半

石菖一錢

琥珀一錢研中服 炙艸分

炙冬二錢

龍眼三枚

失音

六味地黃湯

熟地五錢

山藥一錢

茯苓錢半

丹皮錢半

山藥二錢

澤瀉錢半

鄭聲

補中益氣湯

人參一錢

黃芪錢半

當歸二錢

白朮錢半

陳皮二錢

升麻分

柴胡錢

甘艸分

喜唾

梅杏噙化丸

烏梅十枚

黑枣五個

去核共搗如泥加煉蜜為丸
彈子大每用一丸放口噙化

多言

加味參麥飲

人參五分

麥冬三錢

五味子分

通草分

石菖一錢

川連五分

甘艸三分

白芍一錢

灯心三錢

遺精

茯神湯

茯神五錢

遠志幾半

杏仁三錢

石菖一錢

白茯苓一錢

川連五分

人參一錢

生地三錢

當歸幾半

甘草五分

牡蠣二錢

蓮子七枚

恐懼

補胆防風湯

人參七分

防風一錢

細辛五分

川芎分

甘草五分

茯神錢半

獨活八分

前胡八分

黑參三錢

心睡

參麥黃連湯

人參五錢

麥冬三錢

川連八分

生熟仁五錢 石菖一錢

甘草五錢

自汗盜汗

加味歸脾湯

人參一錢

黃芪錢半

白朮錢半

茯神三錢

杏仁二錢

遠志錢半

甘艸五錢

當歸錢半

麻黃根二錢 牡蠣三錢

紅參三錢

浮麥三錢

心神不安

寧志丸

石菖 二兩

遠志 二兩

當歸 三錢

茯神 五錢

人參 二錢

夏冬 三錢

共為細末煉為丸桐子大服砂為衣每早用米飲服三錢

虛煩不寐

酸棗仁湯

老仁 五錢

人參 分

甘草 分

茯神 三錢

川芎 分

知母 二錢

遠志 一錢

龍眼 三枚

灯心 三寸

勞復

加味當歸四逆湯

柴胡 分

當歸 三錢

白芍 二錢

只寔 一錢

甘草

五分亦名乾薑不經煎

食後

香砂平胃散

蒼朮 三錢

厚朴 錢

陳皮 一錢

木香 五分

砂仁 八分

甘草 五分

生姜 一片

有食積加山楂
麦芽神曲茯苓

陰陽易

當歸白朮湯

白朮 一錢

當歸 一錢

桂枝 一錢

附子 一錢

甘草 八分

白芍 一錢

黃芩 一錢

人參 七分

生姜 三錢

燒裨散

裨穉 分

近法處男用女穉女用
男穉燒灰溫水和服

青竹茹湯

竹茹 半斤

栝蒌根 二兩

水二斗煎
一升服

昆侖湯

韭白根二把 鼠屎十四粒 水煎服

韭根散

韭根 枯姜根 青竹茹 炮姜各五錢共為細末分八分

一錢和服治陽
易危急之症

千金方

治勞復或食復發熱者

梔子仁一錢 生石膏三錢 鼠屎十四粒 淡豉半合 水煎服

麥冬湯

治勞復欲絕者用之大效能起死回生

麥冬二兩 甘草二兩 粳米半合 鮮竹葉十五片 黑棗二枚

右為細末水三盞煎米令熟去米約湯盞半八葉五錢煎至

一盞去渣溫服不能服者綿浸滴口中此方不用石膏以
焦無火也加人參更妙

疫疹之形

鬆浮本方加大青葉 元參

緊束有根本方加石膏 生地 犀角 元參

桃仁 紫艸 川連 紅花 連翹
歸尾

疫疹之色

紅活本方加大青葉 元參

淡紅本方加大青葉

元參

深紅本方加大青葉

元參

生地

艷紅本方加大青葉

生地

石膏

丹皮

元參

紫赤本方加石膏

生地

元參

川連

犀角

丹皮

桃仁

紅白砂本方加生地

當歸

蟬衣

附一紫黑相間治驗

正陽門外蔣家衚衕口內祥泰布鋪祁某晉人也長卽病疫原肘
謝以不治又延一人亦不治及至邀予已七日矣診其脉六部全
伏察其形目紅面赤滿口如霜頭汗如雨四肢如冰稽其症時昏
時燥謔妄無論嘔泄兼作小水癰閉週身斑疹紫黑相間幸而鬆
活浮於皮面毒雖盛而猶隱躍此生机也檢視前方亦用犀連大
劑不過錢許乃杯水之救耳予曰今卽之症最險不畏予藥過峻
死中求活不然災在十四日初應甚切予用大劑石膏八兩犀角
六錢黃連五錢餘佐以本方之味加伏龍肝一兩木通三錢滑石五

錢猪苓澤瀉各二錢更加生地一兩紫草三錢歸尾三錢大青葉
二錢以色紫黑也連投二服至九日脉起細數手足回溫嘔雖止
而泄如旧仍用本方去伏龍肝入二服至十一日脉轉洪數頭汗
遂止黑斑變紫小水亦利大便亦寔但語妄如前身忽大熱煩躁
更甚大渴不已以大外透也仍用本方去滑石水通緒爪澤瀉加
花粉山豆根以漿微痛也更以冰水與服以濟其渴又二帖色轉
深紅熱勢稍殺語妄間有猶渴思冰按本方減生地五錢去歸尾
紫草豆根花粉又二服諸症已退十分之三藥減四分之一但飲
水而不思食初疑而叩曰病雖減而十數日不食尚能生乎予曰

生矣按法治之二十一日方可全愈又二服斑化多半胃氣漸開
熱亦大減照本方藥四分之二去大青葉又二服斑點全消飲食
旋食旋健方能起坐脰其脉尚有六至猶陰熱不即清之其勢復
張更難為力伏用石膏二兩四錢犀角三錢黃連二錢餘亦竊疑
十九日用石膏一兩二錢犀角二錢黃連一錢加烏梅三箇酸以
收之也予曰前言二十一日方能成功今已十九日矣全即如此
可見前言之不謬也初某喜曰若非立定主意恐為衆口所誤初
止此方体全堂不肯賣藥叩其所以言誤開分所以八錢為八兩
六分為六錢耳予歷指同鄉服此得全者頗多雖膏猶囑以再三

斟酌二十日犹用石膏八錢犀角錢半黃連八分加洋參二錢
冬三錢歸身二錢川芎一錢以調氣血二十一日用八珍湯加
冬五味立方需大紙一張昨言初方藥店不肯發藥今令即已
錄一治法於方前計服石膏黃連犀角若干使彼知予用藥之
奇即藥鋪亦未之見也

錄曰瘟毒瘰癧疫症之最重者然有必活之方無如醫家不
敢用病家不敢服甚至鋪家不敢賣有此三不敢疫癘之死
於誤者不知凡幾可勝嘆哉今即之症蒙相信之深進予盼
治子用大劑連投十五帖今全安計用石膏六斤有零犀角

七兩有零黃連六兩有零此前人之所未有後人之所未見
故筆之於書以徵奇效云

附一紫痧呃逆治驗

丙午夏四月塞道掌姪孫兆某者病疫已十一日吳原診辭以傳
後事塞公另延一醫用理中湯兆某妻舅工部員外郎伊公素精
醫術不肯與服曰若治此症非余某不可其家因有人進謬言予
用桑過峻懼不敢請伊公力爭是予甚切予因知過之慨慨然同
往診其脉沉細而數驗其症週身斑點紫黑相間加以臂胃赤視
謬語無倫四肢如冰呃逆不止舌卷囊縮手足動搖似若循衣此

寔危症幸而兩目紅赤嘴唇焦紫驗具是熱極視前方不過重表
輕涼此杯水投火愈增其焰以致火焰蜂起予用大劑更加元參
三錢大青葉二錢使其內化外解調服四磨飲本家懼不敢服但
公身任其咎親身煎藥半日一夜連投二服吃逆頓止手足遂溫
次日脉轉洪數身忽大熱以毒外透也予向伊公曰按法治之二
十一日得痊但此劑不過聊治其焰未拔其根藥力稍懈大勢復
起一方服至五日病勢大減藥亦減半服至八日藥減三分之二
去大青葉服至十日藥減四分之三以後諸症全退飲食漸進計
服石膏五斤十四兩犀角四兩六錢黃連三兩四錢奉家狂喜始

悔遲誤者之誤也

附一昏憤吃逆治驗

右營守將費公名存孝者年近七旬癸丑四月病發已八日矣始
邀予治診其脈細數無主觀其形色如蒙垢頭汗如蒸昏憤如癡
諸語無倫身不大熱四肢振搖且冷斑疹隱於皮內紫而且赤辛
不束緊此疫毒內伏症亦危矣如逆不透毒無所洩終成悶症竟
在十四日檢視前方不外荊防升葛不知毒火壅遏之症不清內
熱下降麻終不出徒肆發表愈增其勢燔灼火熾斑愈過矣予用
大劑石膏八兩犀角六錢黃連五錢加大青葉三錢升麻五分使

毒火下降頭面外透此內化外解濁降清升之法次日週身斑現
紫赤如錦精神若明若昧身亦大熱手足逆溫間有逆氣上衝仍
照本方加生地一兩紫草三錢調服四晝氣其始懼逆氣上衝予
曰無妨服此即止進門時見又貼有堂號因問曰人延醫乎其姓
曰相好請來但診其脈不服藥耳予曰予治此症前人未有昨日
敢服此方今叔活矣然見者必以為陸君其誌之後醫者至果見
予方大詫其非曰一身斑疹不按古法用如許寒涼水斑疹如何
能透急宜提表似或可救即用荆防升葛更加麻黃連服二煎及
至夜半晚逆連聲四肢厥逆足涼過膝季家驚惶追悔莫及守城

而進叩門求見問其所以曰變矣問服何方曰他方予曰既服他
方仍請他治之其姪見予不往權將四磨原方連灌二煎吃逆頓
止手足遂溫轉息予素契者登門叩恩予念其以官為家又係異
鄉人仍按本方大劑調治二十一日全愈計用石膏五斤四兩犀
角五兩二錢黃連四兩八錢此癸丑四月間事也

附一疾中帶血治驗

安徽富藩台堂大人病疫初起但寒不熱頭暈眼花腰疼痛腎
者誤認虛寒用六味加杜仲續斷牛膝木瓜兩服後昏沉如迷呼
吸將絕並不知其為病所苦令叔五公現任兵部郎中邀往看診

其脈沉細而數按其心面頰紅赤頭汗如淋身熱肢冷舌燥唇焦
予曰非虛也乃疫耳五日種仁形狀是虛何以言疫予曰若是虛
症面頰不至紅赤舌不焦唇不燥週身大汗乃元將脫之象豈獨
頭汗如淋身熱肢冷哉大劑決不敢服曾用涼膈散清其內熱明
日斑疹微露症自明矣次日斑點隱隱含于皮內互見發然日幾
誤矣即投敗毒散中劑加大青葉錢五十文次日週身斑見
紫赤鬆浮身忽大熱肢亦不冷煩燥大渴即換大劑石膏八兩犀
角六錢黃連五錢加生地一兩紫艸三錢大青葉二錢連投二服
斑轉艷紅唯咳嗽不止痰中血帶粉紅此金被火灼即按本方加

羚羊角三錢絲炭二錢丹皮二錢人二服嗽寧血止色轉深紅熱
亦大減照本方去紫艸羚羊角桑皮絲炭或去地五錢石膏二兩
犀角二錢加水通錢半消石五錢以小水不利也人二服諸症已
減十分之六犹用石膏二兩四錢犀角二錢黃連錢半土地四錢
去水通消石又二服後用犀角錢半黃連八分石膏八錢加人參
一錢當歸一錢麥冬三錢五味子五分連服二帖飲食倍增精神
漸旺矣

附一閉目無占治驗

世義騎都尉常公係戶部郎中觀公名岱者中表弟也癸丑五月

病疫觀公素精醫術調治半月斑疹暗回而諸症反劇已備後事
乃弟因一息尚存復邀予治診其脉若有若無現其症閉目無聲
四肢逆冷大便旁流清水予謝以不治閤家拜懇但求開方死而
無怨予見其嘴唇微腫紫而且黑知內有伏毒非不可救熱乘於
心肺故昏悶無聲乘於肝故閉目乘於脾故四肢逆冷乘於大腸
故旁流清水檢視前方亦是清熱化斑等劑觀公素性謹慎藥雖
不錯只治其焰未拔其根當此危急之秋再一探視死在三七予
按本方用犀角八錢黃連六錢加酒石一兩木通三錢猪苓澤瀉
各二錢桑皮三錢枯姜霜二錢另用石膏一斤竹葉一兩煎水煎

藥連進三煎次日脉起細數手足遂溫身流亦減小水亦通目開而声出矣仍用本方去滑石木通倍冬澤瀉系次括要又服以後遂日減用七日而痊覲公登門道謝曰舍表弟之症一百死一百一十九一十君能生之敢不心悅而誠振

附一語安若有所見治驗

工部員外彩公名柱者令親內務府高某病幾九日遂予其張浮大而數身熱如炉目紅面赤斑成片忽然大叫若有所見卒然驚惕若有所懼語平生未有之事未見之人卒家驚恐疑有邪附本地風俗最喜看香送祟以致異端之術不絕門子進屋內看

烟一室滿壁符籙咒語予曰此邪予能去之將此一概收去只用
大米四塊安置四角彩問何故予曰當此暑熱病此大熱之症加
以香燭輝煌內外夾攻不任何待此邪熱乘于肝胆故熾狂外用
多冰收其薰蒸暑氣內服清涼散解之藥病除而狂自止焉有邪
附者乎遂用大劑七日而愈

附一昏悶無言治驗

理藩院侍郎奎公四令弟病疫昏悶無言身不大熱四肢如冰六
脈沉細而數延一不諳者已用回陽救急湯中表兄富公力爭不
可及予至診其脈沉細而數察其形唇焦而裂因向富公曰此陽

極似陰非陰也若是真陰脉必沉遲而白烏有脉數者其
誤為陰亡者哉此熱甚大乎脾經故四肢氣逆系乎心肺故昏悶
無声况一身斑疹紫赤非大副不能挽回遂用石膏八兩犀角六
錢黃連五錢餘注以大青葉三兩連服二帖至夜生身大熱手
足溫次日脉轉洪大人一服熱減而神清矣以後因症逐日減用
八日而愈幸家任喜以為異傳

附一鼻血泉湧治驗

癸丑冬月國子監司業五公名格者二令媳病疫惡寒發熱頭痛
嘔吐請一匠者用表散藥加藿香半夏蒼朮其症入劇人延一人

用清涼之劑稍安次日加石膏三錢犀角八分黃連五分赤芍轉沉
伏四肢逆冷昏迷若寐匿者認作轉陰謝以不治五公滿腹惡懷
徘徊庭院夫人曰數年前活我者誰乎五公恍然大悟曰非此人
斷乎不可邀予述其所以診其脈驗其斑色曰此易事耳五日明
係熱症投涼藥反劇更有何術予曰治病猶兵也小國不可以敵
大國固不可以敵強病大藥小反增其勢予按法治之管教十四日
而愈未幾二令郎亦病於脈觀其色曰令郎之症受毒已深較令
媳更重即按法治之七八日腫已定症難以收卒愈在二十一日
而服後週身斑點紫赤相間有紫有赤有紅有浮五公駭然曰君

言彰前更重何其驗也即用大劑石膏八兩犀角六錢黃連五錢
更加生地一兩紫艸三錢歸尾二錢大青葉三錢一服二煎更以
四煎熬水次日煎藥一方服至六帖緊者鬆未者浮但鼻血泉湧
譟譟無倫五懼去血過多乎曰此熱血妄行毒犹因此而得發越
止之甚易即照本方加棕炭三錢桑皮三錢羚羊角三錢兩服血止去桑皮
棕炭羚羊角又二服胃氣漸開色轉淡紅漸有退者用石膏四兩
犀角四錢黃連三錢去紫艸歸尾減生地五錢大青葉錢半又二
服斑全消用生地三錢犀角三錢黃連二錢石膏二兩八錢又二
服飲食大進自頸至胸腹泛紅砂此餘毒盡透也用生地三錢犀

角二錢黃連錢半石膏一兩六錢人二帖精神漸長仍用生地三錢犀角錢半黃連八分洋參一錢炙冬三錢歸身錢半石膏八錢酸梅二个又三服而安五公喜而言曰小兒之生先生再造矣予曰前治令媳乃救令郎耳此症若初服生姜半夏朮藿香斷不可救斑乃胃熱之症諸藥大能燥胃火上添油尚望生平嗣後一家連治七人俱是大險在于治之無難五亦服之若素

附一嘴唇掀腫治驗

四川聞藩台令媛癸丑冬月一病即斑其色深紅而熱症原不重但脈細數有力此內有伏熱即用中劑加大青葉連投五服斑退

而神安丹二服可以無事因素畏服藥不肯多服又忌飲食越
七日身忽大熱大渴嘴唇掀腫牙縫流血口穢噴人三月大劑加
生地一兩次日熱渴稍殺而頭亦紅腫即於本方加牛子夏枯草
銀花各三錢連投三服頭雖消右腮又腫又于本方去牛子夏枯
艸加板藍根馬勃又三服而腮腫全消唇亦稍散週身泛沙紅白
相間又于本方去板藍根馬勃加大青葉又三服嘴唇全消通身
脫皮成片後按本方調理十餘日方痊此症計用石膏八斤有零
犀角八兩有零黃連七兩有零聞公任部曹時與予交契大人信
任無疑是以得痊

附一舌甲治驗

正紅旂薩軍和隆武者乃太僕寺員外郎公胞姪也予世好丙午夏出疹本輕其尊人畏予用藥過峻懼不敢遽反至舌卷囊縮方逮予治診其脈細數有力觀其形氣壯神昂非死候也反驗其舌其黑如煤其堅如鉄敲之屢有聲予問曰前醫何以不藥尊人曰彼云滿舌皆黑前人列於不治予曰水來尅火焉有胎厚如甲哉按此起病之初舌胎必白而厚本火極水化之象誤認狹寒妄肆溫表燔灼火焰以致毒熱阻於中焦離不下降故不上升然氣薰蒸由白而黃由黃而黑矣治宜重清胃熱清心腎非少舌

大寒不能挽回即用大劑重用犀角黃連更加生地知柏抑陽水
陰連投四服其胎整脫亦如古大後用三小劑而痊

附一半身不遂治驗

癸丑四月國子監馮公名海來者至舍間叙及陳令親病疫後又
痢予曰若以痢治之防變別症及至七月馮公復至言陳令親病
痿兩月百藥無效相邀起之及至診其脉沉緊弦數現其色若無
病然但偃仰在牀不如反側自腰以下痛如火燎檢視前方總不
外滋陰補氣杜仲續斷牛膝虎胥等類予曰以此症而施此藥誰
曰不然但以脉合症以症合形乃熱毒流於下注非痿也遂用小

制敗毒飲如知柏木瓜單薤半膝咸吳仙不通兩股痛減而足能運動六服扶起能立未至十服能步履矣後用湯藥每送扶桑丸一月而痊

附一瘰癧毒瘡治驗

原任西林遊擊蒙古成公名德者契友也甲寅五月夫人左臂角發一瘡大如豆白如珠憎寒發熱頭痛如劈其汗如淋臉腫過半胸膈鬱悶生卧不安邀予往看診其脉沉細而數予曰若以外科斷之則為贅疽瘡形如此百無一救然非疽也乃瘰癧一瘰癧親友患多需大紙一張錄其脉按辨明瘰癧以杜誤症之訛遂用敗毒

欽石膏六兩犀角四錢黃連三錢更加銀花馬勃板藍根一服後
腫消過半自言胸中舒暢次日又服全消又貼一貼愈矣

疫疹一症四時皆有惟春夏更甚古人有謂傷寒兩感百全
一二疫症初起十有八九都類如斯治一得一治十得十何
也上古無疫偶一有之吾意古人或只就傷寒一例以推其
症本究是疫亦未可知偶遇此症先斷以死即投神和靈寶
報之不效茫無一策待死而已數十年來吾以此法治人甚
衆敢謂補前人之缺亦以仰休

聖天子加惠元元之至意不忘秘之指簡奉其元者御附治驗即如

汪副憲之隱疹如迷蔣閣學之癰赤譚語沈道掌之循衣摸
牀張司寇如君之母鬱冒直視馮鴻臚如君之錯語昏沉人
以傷寒日之固難予以疫症治之甚易皆症之輕者不足以

附治驗

跋

老子不云乎下士聞道大笑之下笑不足以爲道道固有之醫術亦然余師愚先生之治疫疹也神明變化其法開前人之未有蓋技而進乎道者也甲寅夏京都疫氣流行予幼兒一女皆患疫疹醫以荊防發表治之多方一律愈表愈鋼相繼夭殤時大兒亦患此症較幼兒弱女更有甚焉延先生診視曰此病下難愈但恐不敢服耳遂用大劑清瘟敗毒飲石膏八兩黃連五錢犀角六錢犀角

驚咋舌交起而誇之親朋中之識藥性者亦莫不咸以爲然

方悔前醫之誤

而先生之謗猶未息也此所謂道大莫當
三謂歟夫以六
亡呼吸之頃豈容稍有舛誤乃既有明效大
肆雌黃雖曰習見難除不將以人命為兒戲乎此疫疹一得之則
所不容已而先生之用心可謂仁矣予嘗謂天下事不學則已學
則必當造其極致苟非殫心竭慮洞澈源底而欲聊且補苴以求
免時俗之幾笑則其為害也必甚而譏笑亦究不免若自以窮其
妙雖或驚世駭俗而人言又不足道者天下事可為知者道難為
不知者言獨一醫也乎哉吾於先生是編重有感焉是為跋

乾隆五十九年歲次甲寅中秋前五日

賜進士出身前江南常鎮通道工部營繕司郎中年家春同學弟松

齡頓首拜撰